Pszenica ozima – wpływ opóźnionego terminu siewu na plon pszenicy ozimej **Str. lewa**

Klasa gleby: IIIa
Przedplon: sorgo
Nawożenie w czystym składniku w kg/ha – przedsiewne: N – 0, P – 51, K – 83
– pogłówne: N – 140
Siew: 31.10.2008r.
Zaprawa: wg. hodowcy
Ilość wysiewu: zróżnicowana odmianowo 195– 292 kg/ha (350 - 500 szt/m^2)

Odmiany: kolejność od kamienia

1. Bristol
2. Tulsa
3. Akteur
4. Mikula

Zabiegi pielęgnacyjne:

Data	Nawożenie azotowe w kg/ha	Zwalczanie chwastów	Zwalczanie chorób	Zwalczanie szkodników	Zapobieganie wyleganiu	Dokarmianie dolistne
24.03.2009	30 – Saletra amonowa					
30.04.2009	60 – Saletra amonowa					
08.05.2009			Capalo 337,5 SE – 2l/ha			
14.05.2009		Lintur 70 WG – 120g/ha + Chwastox Extra 300 SL – 1l/ha				
18.05.2009						Wuxal Top 36 – 10l/ha
26.05.2009	50 – Saletra amonowa					